

shinyihuang00 / March 03, 2016 12:41AM

[感染力超強新變異輪狀病毒G8 一同把關孩子的健康](#)

根據新聞媒體報導，台灣兒童腸胃炎監視網路（TPIDA）近期監測9家醫學中心發現，從2014年到至今，變種的G8輪狀病毒不但已經傳進國內，且已有5起嬰幼兒因感染G8輪狀病毒而導致重症的案例，有別於以往流行最大宗的G1。此新型變異的病毒非常凶猛，感染力很強，不可小覷，應透過疫苗積極把關孩子的健康。

輪狀病毒傳染途徑主要是經由糞口傳染，也就是感染者的糞便中帶有大量病毒顆粒，若是清潔不乾淨，病毒顆粒會散布到手上或物體表面，健康的幼童手上沾到病毒顆粒後，有接觸到口、鼻，就會受到感染。根據研究顯示感染者糞便每公克病毒顆粒高達1000億顆，而只要10顆病毒就可以讓另一個健康的幼兒發病，傳染力相當地強烈。

輪狀病毒是造成嬰兒和小孩嚴重腹瀉的主要病原，潛伏期約2至3天，初期發病會出現高燒、嘔吐集水瀉等症狀，幾乎每個小孩歲在5歲之前都會被輪狀病毒感染，感染的高峰年齡是6月到2歲之間，且以秋冬感染機率較高，若沒有及時治療，嚴重的話還會造成脫水、電解質失衡、休克甚至死亡，因此輪狀病毒的威力是每位父母親都不可輕忽的。

雖然在醫界尚無相關治療輪狀病毒的藥物，僅能透過支持性療法來改善，最有效的方法就是接種疫苗，為避免輪狀病毒對於嬰幼兒、學齡前孩童造成威脅，如果家中新生兒已經滿6週，建議爸媽進快帶寶寶接種口服輪狀病毒的疫苗，早一步地防範輪狀病毒的侵襲。

---