shinyihuang00 / March 03, 2016 12:43AM

預防勝於治療 汐止吳婦產科子宮頸癌疫苗一同守護女性健康

子宮頸癌是全世界女性僅次於乳癌最常見的癌症，根據世界衛生組織估計，每年約有五十一萬個子宮頸癌新增病例，並有二十八萬八千位婦女死於子宮頸癌。汐止吳婦產科醫師指出，在台灣子宮頸癌更高居歷年台灣女性癌症發生率的首位，建議女性預防更勝於治療，透過施打子宮頸癌疫苗來提前防範子宮頸癌或是人類乳突病毒引起的相關疾病。

目前發現99.7%以上的子宮頸癌與人類乳突狀病毒(HPV) 有相當密切的關係，尤其是高危險群、致癌性高的人類乳突狀病毒，汐止吳婦產科醫師說明，一般最常見的高危險群、致癌性的人類乳突病毒為第16、18、31、33、45、52、58型，而其中的第16和18型病毒所引起的子宮頸癌，更佔了所有子宮頸癌的70%。

子宮頸癌疫苗以9至26歲的女性為主，一共分為三階段，第一階段，經醫師評估過，無出現過疫苗接種而產生過敏現象、出血性問題、發燒、懷孕、或懷孕計畫時即可施打。並在首次施打後的2個月和6個月，再進行第二、三劑的施打，完成三階段的施打，才能確保子宮頸癌疫苗對人體產生最佳的保護效力。

子宮頸癌疫苗和子宮頸抹片檢查缺一不可，施打子宮頸疫苗後仍要搭配子宮頸抹片檢查，才可以為子宮頸癌作最早的診斷治療及預防，汐止吳婦產科醫師提醒，子宮癌疫苗疫苗為預防性疫苗，在未發生性行為前或未受任何HPV感染之前施打是最佳的時機，如果女性已發生過性行為，則建議於施打疫苗前先做子宮頸抹片檢查，確認有無感染再進行子宮頸癌疫苗的施打。