

Anonymous User / January 07, 2015 02:24PM

[脂肪存活關鍵!邱正宏醫師自體脂肪隆乳分層注射助脂肪存活](#)

兼顧隆乳豐胸與抽脂的自體脂肪隆乳，一向是許多愛美女性隆乳的首選，所謂的自體脂肪隆乳，便是透過移植自身多餘的脂肪贅肉，以注射的方式移植至胸部內，也因是利用自體脂肪完成隆乳，故自體脂肪隆乳不像傳統放入填充物的隆乳方式，自體脂肪隆乳不需要開刀、亦沒有手術後疤痕的問題，這也讓自體脂肪隆乳備受歡迎。景升診所醫美中心邱正宏醫師表示，自體脂肪隆乳優秀的自然與真實感，深受不少愛美消費者之喜愛，然而自體脂肪隆乳效果成敗關鍵，其實在於脂肪是否能穩定存活。

有別於傳統隆乳，自體脂肪隆乳成功與否，與移植之脂肪是否保有活性、穩定存活有著絕大的關聯。景升診所醫美中心邱正宏醫師指出，自體脂肪隆乳算是技術難度較高的整形手術，故此，醫師的經驗與技術相對來的更為重要。除了脂肪抽取、純化的技術會影響到脂肪存活率，但根據醫學文獻也顯示，影響自體脂肪隆乳效果最重要的關鍵，還是在於醫師注射脂肪的方式，若是以不當的方式注射脂肪，即便前面抽取、純化脂肪的步驟沒有問題，還是有可能破壞脂肪，造成脂肪壞死，進而影響自體脂肪隆乳的效果。

景升診所醫美中心邱正宏醫師說明，自體脂肪隆乳雖然沒有傳統鹽水袋、矽膠假體有破裂或滲漏的風險，但自體脂肪隆乳的過程中，若是疏忽了脂肪存活率等細節，還是有可能產生如移植後鈣化或硬塊的併發症。為了降低手術併發症的風險，邱正宏醫師參考國外文獻與多年來實際臨床經驗，研發出沙拉式分層注射方法，注射時讓脂肪與健康組織的接觸面積加大，如此可使脂肪穩定存活，不致容易壞掉，同時也不會產生硬塊，透過此技術移植脂肪，可以使自體脂肪隆乳術後硬塊產生的風風險，由原先的16%降至2%。

自體脂肪隆乳形狀自然、觸感自然有彈性，同時術後沒有莢膜攣縮或破裂的問題，這也讓不少人認為其兼具效果與安全。最後邱正宏醫師也提醒，進行自體脂肪隆乳手術前後，都應經由專業醫師進行完整評估，需與醫師詳細溝通脂肪抽取量、萃取存化方式等等。而且，患者一定要找信譽良好的醫師與診所，才能有最佳的效果。除此之外，在接受自體脂肪隆乳治療後，術後半個月至一個月內不可重壓胸部，建議避免趴睡或側睡，以免影響脂肪存活的情況。