

titit2385 / September 06, 2017 11:38AM

[隆乳避免失敗停看聽 景升診所邱正宏醫師談自體脂肪隆乳防失敗](#)

許多愛美女性渴望藉由隆乳來讓身材更符合理想，不過也正因隨著台灣接受隆乳的女性越來越多，不時也可聽聞隆乳效果不如預期、甚至隆乳失敗的消息。目前台灣隆乳常見的手術方式，除了假體隆乳之外，自體脂肪隆乳也是許多愛美女性會考慮的隆乳方式，景升診所醫美中心邱正宏醫師說明，隆乳手術的成功與失敗，牽涉的因素眾多，隆乳手術前先對隆乳手術有完整的了解，有助於讓隆乳後續能更為順利。

隆乳手術發展至今，依據女性對於隆乳不同的需求與期望，也衍生不同隆乳技術，從最傳統的鹽水袋隆乳，到後續也出現了矽膠隆乳與自體脂肪隆乳的方式。景升診所醫美中心邱正宏醫師表示，過去鹽水袋、矽膠隆乳等手術方式，是透過植入義乳假體來創造豐胸效果，不過這類隆乳術後可能有莢膜攣縮的問題，進而導致胸部變硬、觸感不真實等失敗後遺症發生，此外也有可能破裂的失敗風險存在。

反觀自體脂肪隆乳，隆乳手術方式是藉由抽取自身多餘脂肪，將脂肪經過純化步驟處理，去除脂肪中的雜質，再注射回填至胸部，除了符合現代人整形仍追求的自然效果，也能避免上述義乳隆乳術後可能發生的失敗後遺症。景升診所醫美中心邱正宏醫師指出，自體脂肪隆乳兼具自然與成效，因此不少愛美女性對隆乳的接受度提高，但自體脂肪隆乳並非全無失敗可能，重點還是在於醫師的隆乳技術與經驗多寡。

景升診所醫美中心邱正宏醫師補充，過去自體脂肪隆乳在臨床上常見的問題，通常是出自於自體脂肪隆乳，發現移植的脂肪存活率較低，而景升診所醫美中心邱正宏醫師參考國外文獻，配合實際操作經驗，研究出「分層沙拉式打法」，將注射部位分成胸肌、乳腺下和皮下數層，注射時脂肪與健康組織的接觸面積大，脂肪存活率相對提高，有助於降低自體脂肪隆乳術後失敗的風險，讓隆乳的效果更臻完美、符合理想。